

СМЕСИМОСТ: Косайд 2000 ВГ не е смесим с киселинни разтвори и алуминиев фосетил.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Да се използва значително количество вода, за да се постигне добро покритие на културите. Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. След това я калибрирайте така, че да се постигне добро покритие на всички растителни части на културите. Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с вода и пуснете бъркалката. Добавете нужното количество **Косайд 2000 ВГ** директно в пръскачката. Продължете с разбъркването докато пълните резервоара догоре с вода и по време на пръскането.
Ако РН на работния разтвор е по-малко от 6.5 може да се получи фитотоксичност.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ:
В регистрираната доза и начин на приложение при нормални условия на употреба **Косайд 2000 ВГ** не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБАВЯН:

- За приготвяне на работния разтвор да се използва чиста вода.
- Да се осигури пълно покритие на растенията за максимален ефект.
- Компетентният орган не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от използването на Косайд 2000 ВГ при малина и орех.
- Категория на употреба - **Непрофесионална** - прилага се от лица, навършили 18 години.
- Карантинен срок – **лоза: 14 дни; бадем и лешник: 28 дни; краставица, пъпеш, фасул и целина: 7 дни; фъстъци и лимон: 21 дни; ягода: 3 дни; круша, ябълка, кайсия и нектарина: не е приложимо.**

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Косайд 2000 ВГ е фунгицид и бактерицид с контактно действие. Медта има предпазно и антиспорообразуващо действие. Той образува защитен слой върху растителните части и ги предпазва от проникване на заразата.

- ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:**
 - **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА:** Да се съблечне работното облекло и да се измие обилно тялото със сапун и вода. Консултирайте се с лекар ако е необходимо.
 - **ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ:** Изплакнете ги обилно с вода в продължение на 15 мин и да се консултира лекар.
 - **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Да се осигури кислород или изкуствено дишане. Да се потърси лекарска помощ.
 - **ПРИ ПОГЪЛВАНЕ:** Да се дават 1-2 чаши вода. Да не се предизвика повръщане без медицински съвет. Консултирайте се с лекар. Да не се дава нищо на човек в безсъзнание.
 - **СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ** – антидот: Угитол. При поглъщане да се направи промивка на стомаха. Пострадалият да е под лекарско наблюдение.
 - **ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШИНИ СЛУЧАИ:** УМБАЛСМ „Пирогов“ - София, Токсикологично отделение тел. 02/915 44 00 и 02/915 4233. Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
H302: Вреден при поглъщане.
H332: Вреден при вдишване.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410: Силно токсичен за водните организми, съдълготраен ефект.
РЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P261: Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.

P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила / предпазна маска за лице.
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P312: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ.

P391: Съберете разлятието.
P501: Съдържанието / съдът да се изхвърли в одобрено място за изгаряне или за събиране на отпадъци съгласно законодателството.

EUN401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или неговата опаковка (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхности води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Носете предпазно облекло, маска за лицето, очила и ръкавици;
- Да не се вдъхва мъглата от изпарения разтвор;
- Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата;

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Косайд 2000 ВГ да се съхранява в оригинални опаковки, на сухо и добре проветриво място, при умерена температура. Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:
Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR 2015/.

ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ:
Не е токсичен за пчелите. Токсичен за рибите и водните организми. Да не се работи и пръска с продукта на дистанция по-малко от 15 метра от канализации, кладенци и канавки. Да не се пръска на по-малко от 20 метра от естествени и изкуствени водокотчици.

МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ:
Да не се отива с вода към канализационната система. Да се събере с вакуум и да се постави в подходящ затворен съд за последващо унищожаване. Потърсете помощта на специалист ако е необходимо.


МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
Косайд 2000 ВГ не е запалим и експлозивен. Подходящи средства за гасене: водна струя, пяна, сух прах, въглероден двуокис. Да не се използва силна водна струя /риск от замърсяване/. Пожарникарите да носят дишателни апарати.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
Съдържанието на опаковките да се изсипе в съда за приготвяне на разтвора или директно в резервоара на пръскачката. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012г.).

ПАРТИДЕН №:

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:

ПИКТОГРАМИ:



System for Collection of Pesticide Packaging

0617

Kocide® 2000 WG

FUNGICIDE/BACTERICIDE

Косайд® 2000 ВГ

/Фунгицид, Бактерицид/

ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА
НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА СПАЗВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Фунгицид и бактерицид с контактно и предпазно действие срещу мана по лоза, краставица и пъпеш; сачмянка по бадем, кайсия, праскова и нектарина; бактериоза по бадем, лешник, круша, ябълка, праскова, нектарина и фасул, бактериен увяхване по краставица и пъпеш; огнен пригор по круша и ябълка; струпяване по круша, праскова и нектарина; (сиви) листни петна по круша, ябълка и лимон; листен пригор по целина; (ранни) листни петна по фъстъци и фасул; ранно кафяво гниене по круша и кайсия; антракноза по краставица, пъпеш, малина и лимон; краста по краставица и пъпеш; бели листни петна, ветриловидни петна и листно припламване (виолетовокафяви листни петна) по ягода; петносоване на пълките, септориоза и ръжда по малина; сухо гниене по лимон.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Съдържа 538 г/кг меден хидроскид /350 г/кг чиста мед/

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Сu/ОН/2 меден хидроскид

ISO наименование: Меден хидроскид

CAS номер: 20427-59-20

IUPAC наименование: Меден (2+) дихидроскид

КОФОРМУЛАНТИ: инертни вещества

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВГ – Вододиспергируеми гранули

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България със:

Удостоверение за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита на БАЕХ към Министерството на земеделието и храните № 0569 - ПР3 от 19.10.2015г.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РЕГИСТРАЦИЯТА: Spiess-Urania Chemicals GmbH

Frankenstrasse 18 b 20097 Hamburg, GERMANY. Tel.: 0049-40 236520. Fax: 0049-40 23652 255

ВНОСИТЕЛ КНЕ СЕРТИС ЕООД

Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №102 1505 София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/819 49 77, Факс: 02/819 49 70



KNE CERTIS
ALLIANCE FOR GROWTH

СЪДЪРЖАНИЕ
НА ОПАКОВКАТА:

1 кг

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА/ПРИЛОЖЕНИЕ:

Косайд 2000 ВГ се прилага предпазващо. Пръсканията може да започнат преди влизане във вегетация до ранни стадии на развитие на културите и да продължат докато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта. Интервал на третиране 10-14 дни. При по-чести и обилни превалявания интервала между пръсканията се съкращава на 7 дни.

1. Лоза: Мана (*Plasmopara viticola*) по лоза – Доза на приложение: 120гр/дка (0,12%), препоръчително количество на работния разтвор: 100 л/дка вода.

2. Бадем: Сачмянка (*Sligmina carpophila*), Бактериоза по бадем (*Pseudomonas amygdali*) – Доза на приложение: **185-340 гр/дка**, препоръчително количество на работния разтвор: 100-150 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 97-03** (Всички листа са паднали. – Край на събуждането на пълките: листите са отделени, вижда се светло зелен сектор на пълката – до 3 третираня) и/или във фаза **ВВСН 51-59** (Цветните пъпки за затворени, виждат се светло кафяви листи – Повечето цветове с венчелистчетата са отворени като топчици (бял бутон) – 1 третиране). Максимален брой третираня за годината: 4. Интервал между приложенията: не е приложимо.

3. Лешник: Бактериоза (*Xanthomonas corylina*) - Доза на приложение: **155-340 гр/дка**, препоръчително количество на работния разтвор: 100-150 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 91-99** (Растежът на латорастите е завършил, листата са все още зелени. – Продукцията е прибрана.). Максимален брой третираня за годината: 2. Интервал между приложенията: 20-25 дни.

4. Орех: Бактериоза (*Xanthomonas corylina*) - Доза на приложение: **155-340 гр/дка**, препоръчително количество на работния разтвор: 100-150 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 91-99** (Растежът на латорастите е завършил, листата са все още зелени. – Продукцията е прибрана.). Максимален брой третираня за годината: 2. Интервал между приложенията: 20-25 дни.

5. Круша: Струпяване (*Venturia pirina*), Сиви листни петна (*Septoria spp.*), Ранно кафяво гниене (*Monilinia laxa*), Бактериоза (*Pseudomonas syringae*), Огнен пригор (*Erwinia amylovora*) – Доза на приложение: 155-680 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 100-200 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 93-07** (Листопадът започва. – Начало на разпуване на пълките: първите зелени връшчета на листата са едва видими). Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: не е приложимо.

6. Ябълка: Листни петна (*Septoria spp.*), Бактериоза (*Pseudomonas syringae*), Огнен пригор (*Erwinia amylovora*) – Доза на приложение: 155-680 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 100-200 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 93-07** (Листопадът започва. – Начало на разпуване на пълките: първите зелени връшчета на листата са едва видими.). Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: не е приложимо.

7. Кайсия: Сачмянка (*Sligmina carpophila*), Ранно кафяво гниене (*Monilinia laxa*) – Доза на приложение: 185-280 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 100-120 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 97-99** (Всички листа са паднали. – Продукцията е прибрана. – до 2 третираня) и/или във фаза **ВВСН 00-03** (Покрой: листните и цветните пъпки и покрити с тъмнокафяви листи. – Край на събуждането на пълките: листите са отделени, вижда се светло зелен сектор на пълката. – до 2 третираня). Максимален брой третираня за годината: 4. Интервал между приложенията: не е приложимо.

8. Праскова, Нектарина: Сачмянка (*Sligmina carpophila*), Струпяване (*Cladosporium carpophilum*), Бактериоза (*Pseudomonas spp.*) – Доза на приложение: 155-285 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 100-120 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 93-99** (Започва листопадът. – Продукцията е прибрана. – до 2 третираня) и/или във фаза **ВВСН 00-03** (Покрой: листните и цветните пъпки и покрити с тъмнокафяви листи. – Край на събуждането на пълките: листите са отделени, вижда се светло зелен сектор на пълката. – до 2 третираня). Максимален брой третираня за годината: 4. Интервал между приложенията: не е приложимо.

9. Краставица, пъпеш: Мана (*Pseudoperonospora cubensis*), Антракноза (*Colletotrichum idaeicola*), Краста (*Cladosporium cucumerinum*), Бактериен увяхване (*Erwinia tracheiphila*) – Доза на приложение: 100-155 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 50-100 л/дка вода. Третирането се извършва при поява на първи симптоми на заболяване. Максимален брой третираня за годината: 4. Интервал между приложенията: 10-14 дни.

10. Фасул: Листни петна (*Cercospora spp.*), Бактериоза (*Xanthomonas spp.*, *Pseudomonas phaseolicola*) – Доза на приложение: 100-155 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 50-80 л/дка вода. Третирането се извършва при поява на първи симптоми на заболяване. Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: 7-14 дни.

11. Фъстъци: Ранни листни петна (*Cercospora spp.*) – Доза на приложение: 155 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 60 л/дка вода. Третирането се извършва при поява на първи симптоми на заболяване. Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: 7-10 дни.

12. Целина: Листен пригор (*Septoria apicalis*) – Доза на приложение: 100-155 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 50-80 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 13-19** (Разтворен трети същински лист – 9 или повече същински листа са разтворени). Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: 7-10 дни.

13. Ягода: Бели листни петна (*Mycosphaerella fragariae*), Листно припламване/ виолетовокафяви листни петна (*Diplocarpon eariana*), Ветриловидни петна (*Phomopsis oblongata*) – Доза на приложение: 125 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 50-80 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 00-03** (трети лист е развит до начало на узряване, повечето плодове са бели – 1 третиране) и/или във фаза **ВВСН 13-81** (трети лист е развит до начало на узряване, повечето плодове са бели – до 3 третираня) Максимален брой третираня за годината: 4. Интервал между приложенията: 7 дни.

14. Малина: Петносоване на пълките (*Didymella applanata*), Антракноза (*Sphaeloma necator* = *Gloeosporium venetum*), Септориоза (*Mycosphaerella rubi*), Ръжда (*Phragmidium rubi-idae*) – Доза на приложение: 125 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 50-80 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 91-00** (Навлизане в покой – 1 третиране) и/или **ВВСН 00-10** (Покрой до поява на първи лист – 1 третиране). Максимален брой третираня за годината: 2. Интервал между приложенията: не е приложимо.

15. Лимон: Сухо гниене (*Phoma tracheiphila*), Антракноза (*Colletotrichum gloeosporioides*), Листни петна (*Septoria spp.*) – Доза на приложение: 150-325 гр/дка, препоръчително количество на работния разтвор: 200-250 л/дка вода. Третирането се извършва във фаза **ВВСН 95-97** (Окапване на старите листа. – Зимен покой. – до 3 третираня). Максимален брой третираня за годината: 3. Интервал между приложенията: не е приложимо.

Забелка: Възможно е приложение извън стадий ВВСН 95-97, след градушка или измръзване.

275 mm

420 mm

=ΔΙΑΦΑΝΕΣ