

ЗАПОВЕД

№ *РДМ-1271*

София, ... *01.08* 2014 г.

На основание чл. 15л и чл. 15д, ал. 5 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № 12918/17.07.2014 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита във връзка със Заявления с вх. № 07-00-776/25.11.2010 & 7648/29.06.2012 г. на фирма „Байер България“ ЕООД,

НАРЕЖДАМ:

I. Подновяване на разрешаването за пускане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта:

ИНФИНИТО СК

Активно вещество:

Флуопиколид – 62,5 г/л

Пропамокарб-хидрохлорид -625 г/л

Производител на продукта за растителна защита – „Байер КропСайънс САС“, Франция

Производител на активното вещество: Флуопиколид – „Байер КропСайънс АГ“, Германия

Пропамокарб-хидрохлорид – „Байер КропСайънс АГ“, Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: II

Размер и материал на опаковката: бутилка и туба – 1 л., 5 л. и 10 л., полиетилен висока плътност (HDPE).

Срок на годност: до 3 години от датата на производство, когато се съхранява в оригинална, затворена и етикетирани опаковка, на сухо, прохладно и проветриво място.

Забележки:

- Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

Таблица за разрешените употреби

Име на продукта	Култура и/или ситуация	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Формулация		Метод Изд. (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин//макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	Норма на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Конц. на а.в. (i)	Тип (d-f)					г/мл продукт /дка Мин//макс	Вода L/дка Мин//макс	гр. а.в./дка		
Инфинито СК	Картофи	П	Мана по картофи – Phytophthora infestans	Флуопик олип – 62,5 г/л, пропамок арб-хидр-охло-рид-625 г/л	СК	С наземна техника, вегетационно третиране	ВВСН 21-81 – от поява на първото основно странично разклонение до плодовете от първото плодообразуване са все още зелени, семената – светло оцветени	4	7-12 дни	120-160 мл/дка	100 л/дка	При 120 мл/дка (флуопик олип – 7,5 г.а.в./дка) и пропамок арб-хидрол-орид-75 г.а.в./дка); при 160 мл/дка (флуопик олип – 10 г.а.в./дка и пропамок арб-хидрол-орид – 100 г.а.в./дка)	7 дни	(m)

Краставици, тиквички, тикви	II	Мана по тикови – <i>Pseudoperon ospora cubensis</i>	ВВСН 21-83 Поява на първо страшично разклонение – 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене	2	7-12 дни	120-160 мл/дка	100- л/дка	При 120 мл/дка (флуоп иколит – 7,5 г.а.в./дк а и пропам окарб – хидрох лорид - 75 г.а.в./д ка); при 160 мл/дка (флуоп иколит 10 г. а.в./дка и пропам окарб- хидрох лорид – 100 г. а.в./дка)	3 дни	
-----------------------------------	----	---	--	---	----------	-------------------	---------------	---	-------	--

Краставаши, тикивички	О	Мана по тикови – Pseudopezom ozpora cubensis	ВВСН 21-83 Поява на първо странично разклонение – 30% от плодовете са с типичен цвят на зреење	3	7-12 дни	120-160 мл/дка	100- 125 л/дка	При 120 мл/дка (флуоп иколит – 7,5 г.а.в./дк а и пропам окарб – хидрох лорид - 75 г.а.в./д ка); при 160 мл/дка (флуоп иколит 10 г. а.в./дка и пропам окарб- хидрох лорид – 100 г. а.в./дка)	1 ден
--------------------------	---	--	--	---	----------	-------------------	----------------------	---	-------

	Пълнени дни	II	Малко тиквови – Ресендерген ospora cubensis					VVSN 21-86 Поява на първо странично разклонение – 60% от плодовете са с типичен цвят на зряне	2	7-12 дни	140-160 мл/дка	100	При 140 мл/дка (флуоп иколид – 8,75 г.а.в./дка анипролам окарбонхидролорид – 87,5 г.а.в./дка); при 160 мл/дка (флуоп иколид 10 г.а.в./дка и пропам окарбонхидролорид – 100 г.а.в./дка)		
--	-------------	----	---	--	--	--	--	--	---	----------	----------------	-----	--	--	--

Пълном. дши	О	Мана по тикови – pseudoperon ozpora subensis	ВВСН 21-86 Поява на първо странично разклонение – 60% от плодовете са с типичен цвят на зреене	3	7-12 дни	140-160 мл/дка	100	При 140 мл/дка (флуоп иколид – 8,75 г.а.в./дк а и пропам окарб – хидрох лорид – 87,5 г.а.в./д ка); при 160 мл/дка (флуоп иколид 10 г. а.в./дка и пропам окарб- хидрох лорид – 100 г. а.в./дка)	3 дни
----------------	---	--	--	---	----------	-------------------	-----	--	-------

Зеле – бяло и червено	П	Мана по зелето – <i>Perozporo parasitica</i>				ВВСН 13-49 Разтворен трети същински лист-главите са с типичен размер, форма и твърдост	3	7-12 дни	160 мл/дка	100	флуопи колд 10 г. а.в./дка и пропам окарб-хидрох лорид – 100 г. а.в./дка	14 дни
Карфиол, броколи		Мана по зелето – <i>Perozporo parasitica</i>				ВВСН 13-49 Разтворен трети същински лист-главите са с типичен размер, форма и твърдост	1-3	7-12 дни	160 мл/дка	100	флуопи колд 10 г. а.в./дка и пропам окарб-хидрох лорид – 100 г. а.в./дка	14 дни

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

(д) напр. намокрящ прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(е) GCPF Кодове – GIFAR Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(и) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при

приложението

(к) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНl – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Забележки:

1. Дозата от 120 мл/декар да се прилага предпазно, а дозата от 160 мл/декар да се прилага предпазно, в случай, че опасността от поява на вредители е висока или лечебно - в началните стадии на инфекцията.
2. За използване на работни разтвори по-големи от 100 литра/декар, максималната доза не трябва да надвишава 160 мл/декар.

Класификация и етикетиране според Директива 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация	Етикетиране	Специфични предпазни мерки за безопасност
N – опасен за околната среда	N – опасен за околната среда	SP фрази: SP1
Xi – дразнещ	Xi – дразнещ	
R фрази: R43, R50/53	R фрази: R43, R50/53	
S фрази: S1/2, S13, S20/21, S24, S35, S37, S57, S62	S фрази: S1/2, S13, S20/21, S24, S35, S37, S57, S62	

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Код(ове) на класа и категорията на опасност	Код на предупреждението на опасност	Кодове на пиктограмите на сигналните думи	Код (ове) на предупреждението за опасност	Код(ове) на допълнителното предупреждение за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност

II. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно до 30.09.2018 г., считано от датата на издаване на настоящата заповед.

III. Считано от датата на издаване на настоящата заповед, определям срок до 6 месеца за използване на наличните в страната количества от продукта за растителна защита Инфинито, разрешен за предлагането на пазара и употреба с Удостоверение № 0547/05.03.2008 г. на основание Заповед № РД 12-19/10.08.2007 г. на министъра на земеделието и горите. Използването на количествата от продукта включва предлагането им на пазара и употребата им.


IV. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за защита на растенията в 14-дневен срок да се издаде удостоверение за разрешаване за продукта на „Байер България“ ЕООД.

V. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за защита на растенията в интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните да се актуализира списъкът на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София - град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПГ/КАПРЗ/РЗК/БАВХ



На основание чл. 134 и чл. 135, ал. 3 от Закона за защита на растенията, чл. 40-42 от Регламент № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно разпореждането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директите 79/117/ЕО и 91/414/ЕО на Съвета ЕО, Е. 369 от 24 ноември 2009 г. и Препратките с чл. № 129/17.07.2014 г. от съобщенията на Съвета на продуктите за растителна защита във вестник "Официален вестник на ЕС" № 27-00/78 от 11.2017 г. и 3048/29.06.2012 г. на фирма "Байер България" ЕООД.

НАРЕЖДАМ:

I. Подписвам за разпореждането за пукане на пазара и употреба на територията на Република България на следния продукт за растителна защита:

Търговско име на продукта:

ИНФОРМТО СБ

Активни вещества:

Флуотиазид - 62,5 г/л

Пропиконф-хлорохлорид - 62,5 г/л

Производител на продукта за растителна защита - "Байер Крон Сайдс САС", Франция

Производител на активните вещества: Флуотиазид - "Байер Крон Сайдс АГ", Германия

Производител на хлорохлорид - "Байер Крон Сайдс АГ", Германия

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Назначение на употреба: Т

Размер и материал на опаковката: бутелка и кува - 1 л, 5 л и 10 л, високоплътен полимер (HDPE)

Срок на годност: до 3 години от датата на производство, когато се съхранява в оригинален, запечатан и етикетирован опаковка, на сухо, проветриво и прохладно място.

Добавки:

Да не се смесва с други продукти, които могат да имат неблагоприятен ефект. (Да не се помисля за дублирането с вече се използвани продукти. Също да помислят за дублирането с вече се използвани продукти чрез оточни канали на ферми или патенти.)